

А ваш ребенок готов

Закон штата Миннесота об иммунизации

Требования в отношении иммунизации

С помощью данной таблицы определите, какие прививки необходимы ребенку для посещения детского дошкольного учреждения, программы раннего развития и школы (государственной и частной).

Найдите возраст ребенка или класс, в котором он учится, и проверьте, получил ли он то количество прививок, которое указано галочками под каждой вакциной. Дети от рождения до 2 лет, возможно, еще не прошли полную вакцинацию. В таблице на обратной стороне указано, в каком возрасте и какими прививками следует прививать ребенка.

От рождения до 4 лет Программы раннего развития и детские дошкольные учреждения	Возраст: от 5 до 6 лет ^① Детский сад	Возраст: от 7 до 11 лет С 1-го по 6-й класс	Возраст: 11-12 лет С 7-го по 12-й класс
Гепатит А ✓✓			
Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓ ^⑥
DTaP/DT ✓✓✓✓	DTaP/DT ✓✓✓✓✓ ^④	✓✓✓ столбняк и дифтерия	✓ в 7-м классе ^⑦
Полиомиелит ✓✓✓	Полиомиелит ✓✓✓✓ ^⑤	Полиомиелит ✓✓✓	Полиомиелит ✓✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Hib ✓			Менингококковая ✓ ^⑧ в 7-м классе и в 16 лет
Пневмококковая ^② ✓✓✓✓			
Ветряная оспа ✓ ^③	Ветряная оспа ✓✓ ^③	Ветряная оспа ✓✓ ^③	Ветряная оспа ✓✓

Виды вакцинации, рекомендуемые, но не являющиеся обязательными:

Против гриппа ежегодно всем детям с 6 месяцев	
Против ротавирусной инфекции младенцам	Против вируса папилломы человека (ВПЧ) в 11–12 лет

- ① Детям младшего школьного возраста (до 6 лет) рекомендуется следовать графику прививок против полиомиелита и DTaP/DT для детского сада.
- ② Необязательно детям старше 24 месяцев.
- ③ Ребенку, переболевшему ветрянкой, прививка не требуется. Если ребенок переболел после 2010 г., врач ребенка должен подписать форму.
- ④ Если четвертая прививка DTaP сделана после 4 лет, пятую прививку делать не нужно. Последнюю дозу вакцины DTaP следует вводить не раньше 4-летнего возраста.
- ⑤ Если третья доза вакцины против полиомиелита введена после 4 лет, четвертую прививку делать не нужно. Последнюю дозу вакцины против полиомиелита следует вводить не раньше 4-летнего возраста.
- ⑥ Также возможна 2-этапная схема вакцинации против гепатита В для детей от 11 до 15 лет.
- ⑦ Требуется справка о введении не менее трех доз вакцины против дифтерии и столбняка. Если ребенок привит вакциной Tdap в возрасте 7–10 лет, ревакцинация в 7-м классе не нужна. Однако если ребенок получил только Td, в 7-м классе необходимо сделать прививку Tdap.
- ⑧ Одна доза является обязательной в 7-м классе, ревакцинация проводится в 16 лет (10-й или 11-й класс).

Освобождение

Для посещения детского дошкольного учреждения, программы раннего развития и школы в штате Миннесота необходимо предъявить справку о вакцинации ребенка либо официальное освобождение.


Родители могут подать либо медицинское освобождение, подписанное поставщиком медицинских услуг, либо оформить отказ от вакцинации — он должен быть подписан родителем/опекуном и нотариально заверен.

Нужны данные?

Для получения копии прививочной карты ребенка обратитесь к своему врачу или позвоните в Информационную систему штата Миннесота по иммунизации (Minnesota Immunization Information Connection, MIIC) по телефонам 651-201-5503 или 1-800-657-3970.

График прививок: от рождения до 16 лет

ДДУ = детское дошкольное учреждение
 ПРР = программа раннего развития
 К-12 = с детского сада по 12-й класс
 7-12 = с 7-го по 12-й класс



Вспомогательная информация:
 Вы можете пройти вакцинацию бесплатно или за небольшую плату. Обратитесь к своему врачу или в больницу.

Еще не поздно! Если вы все еще не привили ребенка, обратитесь к своему врачу или в больницу для проведения вакцинации.

Согласно закону штата Миннесота, для посещения детского дошкольного учреждения, программы раннего развития и школы ребенку необходимо справка о проведенной вакцинации. Однако если у ребенка имеются медицинские противопоказания либо родители сознательно отказываются от вакцинации, необходимо оформить официальное освобождение (например, от пневмококковой или менингококковой инфекции). Обратитесь к своему врачу или в больницу.

Защитите себя и своего будущего ребенка от коклюша. Сделайте прививку Tdap между 27-й и 36-й неделями беременности. Проконсультируйтесь с врачом.

*Количество зависит от применяемого препарата.

Для получения копии обратитесь к своему врачу или позвоните в Информационную систему штата Миннесота по иммунизации (Minnesota Immunization Information Connection, MIIC) по телефону 651-201-5503 или 1-800-657-3970.

Условные обозначения

DTaP/Tdap = дифтерия, коклюш, столбняк	Hib = гемофильная инфекция, тип b
Нер В = гепатит В	IPV = полиомиелит
Нер А = гепатит А	MCV = менингококковая инфекция
MMR = корь, свинка, краснуха	PCV = пневмококковая инфекция
	RV = ротавирусная инфекция