

# ¿Sus hijos están preparados?

## Ley de vacunación de Minnesota

### Requisitos de vacunación

Utilice el siguiente cuadro como guía para determinar qué vacunas son obligatorias para la inscripción en guarderías, programas de la primera infancia y escuelas (públicas o privadas).

Busque el nivel de grado y edad de su hijo y verifique que haya recibido la cantidad de dosis de cada vacuna que se indican con las marcas de verificación. Es posible que los niños menores de 2 años no hayan recibido todas las dosis. Mire la tabla del reverso para saber a qué edad se deben recibir las dosis.

Nacimiento hasta 4 años Programas de la primera infancia y guarderías	Edad: 5 a 6 años <sup>①</sup> Para kindergarten	Edad: 7 a 11 años Para 1.º a 6.º grado	Edad: a partir de los 12 años Para 7.º a 12.º grado
Hepatitis A (Hep A) ✓✓			
Hepatitis B (Hep B) ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B <sup>⑥</sup> ✓✓✓
DTaP/DT ✓✓✓✓	DTaP/DT <sup>④</sup> ✓✓✓✓✓	✓✓✓ dosis que contienen tétanos y difteria	Tdap <sup>⑦</sup> ✓ en 7.º grado
Poliomielitis ✓✓✓	Poliomielitis <sup>⑤</sup> ✓✓✓✓	Poliomielitis ✓✓✓	Poliomielitis ✓✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Hib ✓			Meningococo <sup>⑧</sup> ✓ en 7.º grado y a los ✓ 16 años
Neumococo <sup>②</sup> ✓✓✓✓			
Varicela <sup>③</sup> ✓	Varicela <sup>③</sup> ✓✓	Varicela <sup>③</sup> ✓✓	Varicela <sup>③</sup> ✓✓

### Vacunas recomendadas pero no obligatorias:

#### Gripe

Cada año para todos los niños mayores de 6 meses

#### Rotavirus

Para bebés

#### Virus del papiloma humano

A los 11 o 12 años de edad

- ① Los niños de primer grado que tienen 6 años de edad o menos deben observar el calendario de vacunación de poliomielitis y DTaP/DT para kindergarten.
- ② No es obligatoria después de los 24 meses.
- ③ Si el niño ya tuvo varicela, no es obligatoria esta vacuna. Si la enfermedad tuvo lugar después de 2010, el médico del niño debe firmar un formulario.
- ④ La quinta dosis de DTaP no es necesaria si la cuarta se recibió después de los 4 años de edad. La última dosis de DTaP se recibe a partir de los 4 años de edad.
- ⑤ La cuarta dosis de poliomielitis no es necesaria si la tercera se recibió después de los 4 años de edad. La última dosis de poliomielitis se recibe a partir de los 4 años de edad.
- ⑥ También se puede seguir un calendario alternativo de 2 dosis de hepatitis B para niños de 11 a 15 años de edad.
- ⑦ Se requiere constancia de al menos tres dosis de la vacuna contra el tétanos y la difteria. Si el niño recibió la vacuna Tdap entre los 7 y 10 años, no es necesaria otra dosis para 7.º grado. Pero si solo fue una vacuna Td, se necesitará una Tdap para 7.º grado.
- ⑧ Se requiere una dosis para 7.º grado y otra dosis a los 16 años de edad (10.º/11.º grado).

### Exenciones

Para la inscripción en guarderías, programas de la primera infancia y escuelas de Minnesota, los niños deben demostrar que han recibido estas vacunas o presentar una exención legal.


Los padres pueden presentar una exención médica firmada por un proveedor de atención médica, o una objeción de conciencia notariada firmada por el padre, madre o tutor.

### ¿Necesita registros?

Para obtener copias de los registros de vacunación de su hijo, hable con su médico o llame al sistema Minnesota Immunization Information Connection (MIIC) al 651-201-5503 o al 1-800-657-3970.

# Cuándo vacunarse desde el nacimiento hasta los 16 años

CC = Guardería (Child care)  
 ECP = Programas de la primera infancia (Early Childhood Programs)  
 K-12 = De kindergarten a 12.º grado  
 7-12 = De 7.º a 12.º grado



**¿Le preocupa el costo?**  
 Hay vacunas gratuitas o a bajo costo disponibles. Consulte a su médico o clínica.

¡Nunca es tarde! Si su hijo no tiene todas las vacunas al día, hable con su médico o clínica para administrárselas.

La ley de Minnesota exige una constancia por escrito de ciertas vacunas para inscribir a los niños en guarderías, programas de la primera infancia y escuelas. No obstante, si el menor tiene una razón médica o si sus padres se oponen a conciencia a alguna o a todas las vacunas, existe una exención legal.

**Los niños con ciertas afecciones médicas pueden necesitar vacunas adicionales** (por ejemplo, contra el neumococo o el meningococo). Consulte a su médico o clínica.

**¿Está embarazada?** Protéjase a usted y a su bebé de la tos ferina. Vacúnese contra Tdap entre las 27 y 36 semanas de gestación. Consulte a su médico.

\* La **cantidad de dosis** depende del producto que usa su médico.

Para obtener copias de los **registros de vacunación** de su hijo, hable con su médico o llame al Minnesota Immunization Information Connection (MIIC) al 651-201-5503 o al 1-800-657-3970.

Significado de las abreviaturas de vacunas

DTaP/Tdap	= difteria, pertussis, tétanos	Hib	= <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
Hep B	= hepatitis B	Hep A	= hepatitis A
MMR	= sarampión, paperas, rubéola	IPV	= poliomielitis
		PCV	= neumococo
		RV	= rotavirus